

公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
Bst 3.0 DNA/RNA polymerase	1600U	P-PR1119

储存条件：-20°C保存

产品简介：

Bst 3.0 DNA/RNA 聚合酶是嗜热脂肪芽孢杆菌（*Bacillus stearothermophilus*）DNA 聚合酶 I 大片段（Bst LF）经过基因突变改造

过的聚合酶。该酶具有 5'-3' 的 DNA 聚合酶活性和链置换活性，无 5'-3' 核酸外切酶活性。与 Bst 2.0 DNA/RNA 聚合酶相比，Bst 3.0 DNA/RNA 聚合酶的热稳定性、扩增速度、链置换速度和逆转录活性有了进一步的提升。适合高温快速 LAMP 类型的等温扩增实验。

活性单位：一个活力单位（1 U）即在 65°C 条件下，30 分钟内催化 25 nmol dNTP 的掺入反应成为酸不溶性物质所需的酶量。

质量控制：SDS-PAGE 检测纯度大于 99%，经检测无核酸外切酶，内切酶活性，无细菌基因组 DNA 残留。通过各种模板进行等温扩增测试。室温存放一周，无明显活性改变。

应用范围：

1. DNA 或 RNA 为模板的 LAMP 等温扩增。
2. 适用于链置换方法扩增 DNA。
3. 高 GC 结构 DNA 的测序和微量 DNA 模板快速测序。

10×Bst Buffer: 200 mM Tris-HCl, 100 mM (NH₄)₂SO₄, 500 mM KCl, 80mM MgSO₄, 1% Tween® 20
pH 8.8 @ 25°C

储存缓冲液: 10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 50% Glycerol, 0.1% Triton
® X-100, pH 7.5 @ 25°C

使用方法：

1. 按以下组分配制 LAMP 等温扩增反应液，建立反应体系。

组分	体积	终浓度
10×Bst Buffer	2.5 μL	1× (含 8mM 的 MgSO ₄)
10mM dNTPs	3.5 μL	1.4 mM
Primer Mix(10×)	2.5 μL	1× (1.6 μM FIP/BIP, 0.4 μM LF/LB, 0.2 μM F3/B3 each)
Bst 3.0 DNA/RNA polymerase (8U/μL)	1 μL	0.32U/μL
模板 DNA 或 RNA	1ng-0.5μg	
补加 ddH ₂ O	至 25 μL	

2. 混匀，离心数秒，置于控温设备中 65°C 反应 30-60min。
3. 反应结束后 85°C，5min 失活聚合酶。电泳检测或肉眼观察并记录结果。

注意：

1. Primer Mix(10×)配制方法，用灭菌水将引物全部溶解至浓度为 100μM 的储存液。取一干净离心管，先加 56 μL 灭菌水，然后取 FIP 和 BIP 引物各 16 μL, LF 和 LB 各 4 μL, F3/B3 各 2μL，混匀即可。
2. 反应体系中可以添加 dUTP 和热敏 UDG 酶。经测试占比 50% 的 dUTP (0.7mM) 完全不影响 Bst 酶活性。热敏 UDG 酶用量可按供应商的推荐用量和方法添加。
3. 可使用带热盖加热的 PCR 仪以及金属加热块或恒温水浴作为控温设备。无热盖加热装置，需要在反应管中添加一滴石蜡油，防止反应液蒸发。
4. 可以在反应体系中添加适当浓度的 SYTO®-9、EvaGreen®、SYBR®、Green I 等荧光染料分子，用于实时荧光等温扩增。
5. 为防止扩增产物污染造成假阳性结果，最好在其它房间对阳性样本进行 2% 以上浓度的琼脂糖凝胶电泳检测。

